

# Eligard

(leuprorelin- acetat)

## UPUTSTVO ZA PRIPREMU LEKA

2/2

### PRIJAVA NEŽELJENIH REAKCIJA NA LEK

telefaksom na (011) 3951 130 ili – elektronskom poštom na nezeljene.reakcije@alims.gov.rs  
• popunjavanjem ONLINE prijave dostupne na internet stranici [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs).

- Prijave možete proslediti i kompaniji AMICUS SRB d.o.o. putem e-mail adrese [medinfo.serbia@swixxbiopharma.com](mailto:medinfo.serbia@swixxbiopharma.com)



VERSION NUMBER  
DATUM PRIPREME: NOVEMBAR 2021.




## OBVEZNO PROČITATI PRE MEŠANJA LEKA


Molimo Vas da celokupno uputstvo za pripremu leka i informacije o leku potražite u Sažetku karakteristika leka.

- Lek Eligard/depo formulaciju sme pripremati i primenjivati jedino zdravstveni stručnjak koji je edukovan za pravilnu primenu leka.
- Ukoliko nije pripremljen na ispravan način, lek ne sme da bude primjenjen pacijentu.
- Uvek pustite da lek Eligard postigne sobnu temperaturu pre mešanja (lek izvaditi iz frižidera otprilike 30 minuta pre pripreme).
- Primenite lek Eligard supkutano odmah nakon rekonstitucije.
- Greške prilikom rukovanjem leka mogu nastati tokom bilo kog koraka u postupku rekonstitucije leka što može dovesti do izostanka efikasnosti leka. Potrebno je strogo slediti uputstva za rekonstituciju i primenu leka.
- Kod slučajeva primene leka Eligard kod kojih postoji sumnja ili saznanje o postojanju greške prilikom rukovanja lekom Eligard, potrebno je pratiti efikasnost leka Eligard praćenjem nivoa testosterona.


## I. PRIPREMA ŠPRICA B




## II. PRIPREMA ŠPRICA A



## III. SKLAPANJE




## IV. MEŠANJE



## V. PRIMENA

Pričvrstite sigurnosnu iglu na špric B držeći Špric i nežno okrećući iglu u smeru kazaljke na satu, otprilike tri četvrtine okretanje dok igla nije stabilna. **Nemojte previše da stežete**, jer to može da prouzrokuje pucanje podnožja igle, što dovodi do isticanja leka tokom davanja injekcije. U slučaju oštećenja podnožja igle, potrebno je primeniti novi lek.



## PRIJAVA NEŽELJENIH REAKCIJA NA LEK

- Svi slučajevi nepravilnog čuvanja, pripreme, rekonstitucije i primene leka Eligard / depo formulacije ili bilo koju sumnju na neželjene reakcije na lek potrebno prijaviti je Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) na jedan od sledećih načina: • popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije koji je dostupan na internet stranici [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs) i slanjem: – poštom na adresu Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija –